

DE UNA CIGÜEÑA NEGRA CAPTURADA EN SÓLLER

por J. Mayol



Un joven ejemplar de *Ciconia nigra* fue capturado a mediados de diciembre de 1970, en la ciudad de Sóller. Se trata de la primera cita de un ave de esta especie en Baleares. El espécimen presentaba varias plumas del dorso iridiscuentes, pero el plumaje general es pardo, más claro en el cuello. En el pico y las patas empieza a aparecer el típico color rojo. El pecho y abdomen son blanco-sucio. Sus medidas son: 98 cms. de largo y 51 cms. de ala plegada.

Esta especie de cigüeña está en trance de extinción. Apenas unas docenas quedan en Alemania Occidental, y no más de 100 en la Oriental. Sólo 3 o 4 parejas había en Dinamarca, en el año 1926, 300 en Polonia y 100 en Checoslovaquia. Censos de 1958/59 dan una población rusa de 587 parejas. Es posible que abunde algo más en algunas zonas desérticas de Asia. En el S.O. de la península Ibérica cría muy escasamente. En Zaragoza y Córdoba se han recuperado dos aves anilladas en Jutlandia.


Este ave anida en los árboles, donde construye un nido de ramas; suele poner tres huevos. Habita cerca de zonas pantanosas, lagunas o ríos. Desgraciadamente es muy perseguida por su rareza. El porcentaje de recuperaciones de las aves anilladas de esta especie es muy próximo al 30%. De tres jóvenes anillados en Dinamarca, uno se recuperó en Hungría, otro cerca del canal de la Mancha y el tercero en Transilvania. De lo cual se deduce que la migración es bastante dispersiva.

BIBLIOGRAFÍA

Bermis, F. — Avés migradoras ibéricas — 1966.



Ejemplar de *Ciconia Nigra* al que se refiere la presente reseña. (Foto R. Galiana, Palma).



Ejemplar de *Ciconia Nigra* al que se refiere la presente reseña. (Foto R. Galiana, Palma).